

可计算性理论

杨睿之

复旦大学哲学学院

2021 年春季

前情回顾

- 存在不可比的 Δ_2^0 度
- 存在低效的单集
 - 有穷损害优先方法

有穷损害优先方法

定理

存在超低效 (superlow) 的单集

证明.

存在低效单集证明中构造的 A 满足 A' 是 ω -c.e. 的

有穷损害优先方法

推论

对每个图灵度 $\mathbf{c} \in \mathcal{D}_T$ 存在图灵度 $\mathbf{a} \in \mathcal{D}_T$ 有 $\mathbf{a} >_T \mathbf{c}$ 且 $\mathbf{a}' =_T \mathbf{c}'$

证明.

相对化低效单集存在定理。对每个集合 C 存在集合 A 在 C 中 c.e., $\mathbb{N} \setminus A$ 无穷, A 与每个 C 中 c.e. 的无穷集合相交 (因而 $A \leq_T C$), 并且 $A' \leq_T C'$

有穷损害优先方法

定理 (Friedberg-Muchnik)

存在不可比的 c.e. 集对 $A|_T B$

证明.

有穷损害优先方法

有穷损害优先方法

定理 (Sacks Splitting Theorem)

任给 c.e. 集 B 和不可计算的 c.e. 集 C , 可以能行地得到低效的 c.e. 集 A_0 和 A_1 , 使得 $B = A_0 \cup A_1$, $A_0 \cap A_1 = \emptyset$, 且 $C \not\leq_T A_i$ ($i = 0, 1$)

注意: 此时 $B \equiv_T A_0 \oplus A_1$

推论

存在 c.e. 集的 $<_T$ 无穷下降链

下期预告

- 康托尔空间