

# 数理逻辑

杨睿之

复旦大学哲学学院

2021-2022 冬季

# 前情提要

# 前情提要

## 定理 (前束范式定理)

对任何公式  $\alpha$  都存在量词前束公式  $\alpha'$  (形如  
 $Q_1x_1 \dots Q_nx_n\beta$ )，使得

$$\alpha \vdash \alpha'$$

# 前情提要

## 一阶逻辑的语义

- 语言  $\mathcal{L}$  中参数符号的语义—— $\mathcal{L}$  结构
- 自由变元的语义——赋值  $s : V \rightarrow |\mathfrak{A}|$
- 项的语义——由  $\mathfrak{A}$  和  $s$  唯一决定的  $\bar{s} : \mathcal{T}_{\mathcal{L}} \rightarrow |\mathfrak{A}|$
- 公式的语义——满足关系： $(\mathfrak{A}, s) \models \varphi$

# 前情提要

- 合同引理
- 记法：
  - $\varphi(x_1, \dots, x_n)$
  - $\mathfrak{A} \models \varphi[d_1, \dots, d_n]$
- 闭语句与真： $\mathfrak{A} \models \sigma, \mathfrak{A} \models \Sigma$ 
  - 此时，我们称  $\mathfrak{A}$  是  $\sigma$  (或  $\Sigma$ ) 的模型
- 逻辑蕴含： $\Gamma \models \varphi, \alpha \models \beta$

# 前情提要

## 定义 (语义蕴含)

给定语言  $\mathcal{L}$ 。称公式集  $\Gamma$  逻辑蕴含  $\varphi$ ，记  $\Gamma \models \varphi$ ，当且仅当对任意  $\mathcal{L}$ -结构  $\mathfrak{A}$  和任意  $\mathfrak{A}$ -赋值  $s$  都有：如果  $\mathfrak{A}$  和  $s$  满足  $\Gamma$  中所有公式（记  $(\mathfrak{A}, s) \models \Gamma$ ），那么  $(\mathfrak{A}, s) \models \varphi$

## 约定

- 以后  $\models$  依语境主要表示 满足 关系和 逻辑蕴涵 关系
- $\alpha \models \beta$  即  $\{\alpha\} \models \beta$ ;  $\alpha \vDash \beta$  ( 逻辑等效 )
- $\models \alpha$  即  $\emptyset \models \alpha$  ( 逻辑有效 )

可定义性

## Berry paradox

"the smallest positive integer not **definable** in fewer than twelve words"

# 结构内的可定义性

## 定义

给定语言  $\mathcal{L}$ ,  $\mathcal{L}$ -结构  $\mathfrak{A}$  以及  $\mathcal{L}$  中公式  $\varphi(x_1, \dots, x_k)$ , 我们称  $\varphi$  在结构  $\mathfrak{A}$  中定义了 ( $\mathfrak{A}$  上的)  $k$ -元关系  $R$ , 当且仅当

$$R = \{(a_1, \dots, a_k) \in |\mathfrak{A}|^k \mid \mathfrak{A} \models \varphi[a_1, \dots, a_k]\}$$

我们称一个  $k$ -元关系  $R \subset |\mathfrak{A}|^k$  是  $\mathcal{L}$  结构  $\mathfrak{A}$  中可定义的 ,  
当且仅当存在一个  $\mathcal{L}$  公式在结构  $\mathfrak{A}$  中定义它

# 结构内的可定义性

## 例

考虑只含有一个二元谓词符号的语言  $\mathcal{L} = \{R\}$ , 以及  $\mathcal{L}$  结构  $(\{a, b, c\}, \{(a, b), (a, c)\})$ , 如图

$$b \leftarrow a \rightarrow c$$

- $\{a, b, c\}$  的哪些子集是可定义的?
- 哪些  $\{a, b, c\}$  上的二元关系是可定义的?

# 结构内的可定义性

## 例

考察关于数论的语言  $\mathcal{L} = \{0, S, +, \cdot\}$ 。令  $\mathcal{L}$  结构  $\mathfrak{N}$  的论域为自然数集  $\mathbb{N}$ ，其他的符号都按照通常的解释，则

- 序关系  $\{(m, n) \mid m < n\}$  在  $\mathfrak{N}$  中是可定义的
- 对每一个自然数  $n$ , 单点集  $\{n\}$  都是  $\mathfrak{N}$  中可定义的
- 所有素数的集合在  $\mathfrak{N}$  中是可定义的

思考：有否不可定义的自然数的子集？能不能举出例子？

# 定义结构类

回顾：

- 在命题逻辑中，我们会说一个布尔函数  $G : 2^n \rightarrow 2$  被一个命题逻辑公式  $\alpha$  定义，当且仅当  $G = B_\alpha^n$
- 命题逻辑中赋值  $v : \mathcal{A} \rightarrow 2$  的角色类似谓词逻辑中的结构  $\mathfrak{A}$
- 一个布尔函数  $G = B_\alpha^n$  对应与一个赋值集合
$$\{v : \mathcal{A} \rightarrow 2 \mid \bar{v}(\alpha) = 1\}$$

# 定义结构类

## 定义

给定语言  $\mathcal{L}$ 。令  $\Sigma$  是  $\mathcal{L}$  闭语句集。我们称

$$\text{Mod } \Sigma = \{\mathfrak{A} \mid \mathfrak{A} \text{ 是 } \mathcal{L} \text{ 结构且, } \mathfrak{A} \models \Sigma\}$$

是  $\Sigma$  所定义的  $\mathcal{L}$  结构类 (所有  $\Sigma$  的模型组成的类)

若  $\Sigma = \{\tau\}$ , 我们记  $\{\tau\}$  所定义的结构类为  $\text{Mod } \tau$

# 定义结构类

## 定义

给定语言  $\mathcal{L}$ ,

- 我们称一个  $\mathcal{L}$  结构类  $\mathcal{K}$  是  $\mathcal{L}$ -初等类 (elementary class)，当且仅当存在 一个  $\mathcal{L}$  闭语句  $\tau$  使得
$$\mathcal{K} = \text{Mod } \tau$$
- 我们称  $\mathcal{K}$  是  $\mathcal{L}$ -广义初等类，当且仅当存在一个  $\mathcal{L}$  闭语句集  $\Sigma$  使得
$$\mathcal{K} = \text{Mod } \Sigma$$

广义初等类与初等类到底有何区别？

# 定义结构类

## 例

令语言  $\mathcal{L}$  只含有等词。

- 语句  $\varepsilon_2$  :  $\exists x \exists y (x \neq y)$  定义的  $\mathcal{L}$ -结构类是什么?
- 所有含有 2-4 个元素的集合组成的类是  $\mathcal{L}$ -初等类?
- 所有无穷集合组成的类是不是  $\mathcal{L}$ -广义初等类? 是不是初等类?

# 定义结构类

## 例

考虑含有等词和一个二元谓词符号的语言  $\mathcal{L} = \{R\}$

- 令  $\tau_1 = \forall x Rxx$ ,  $\tau_2 = \forall x \forall y \forall z (Rxy \rightarrow Ryz \rightarrow Rxz)$ ,  
 $\text{Mod}\{\tau_1, \tau_2\}$  是什么?
- 给出定义偏序类、全序类的闭语句 (集)
- 给出定义等价关系的闭语句 (集)

# 定义结构类

例

群论语言  $\mathcal{L} = \{\approx, \circ, ^{-1}, e\}$ , 则下列闭语句

$$\forall x \forall y \forall z (x \circ (y \circ z) \approx (x \circ y) \circ z)$$

$$\forall x (x \circ e \approx e \circ x \approx x)$$

$$\forall x (x \circ x^{-1} \approx x^{-1} \circ x \approx e)$$

定义了 群 这个初等类

阿贝尔群 是不是初等类? 无扭的阿贝尔群 呢?

以上，我们给出了结构中 可定义 的严格定义，意味着我们可以证明形如 “XXX 是不可定义的” 的命题了。

# 同态与同构

# 同态与同构

## 定义 (同态)

给定语言  $\mathcal{L}$ 。令  $\mathfrak{A}$  和  $\mathfrak{B}$  为两个  $\mathcal{L}$  结构。我们称函数  $h : |\mathfrak{A}| \rightarrow |\mathfrak{B}|$  是一个从  $\mathfrak{A}$  到  $\mathfrak{B}$  的 同态 (homomorphism)，当且仅当它满足下述条件

- 对每个  $n$  元 谓词符号  $P$ , 和每组  $a_1, \dots, a_n \in |\mathfrak{A}|$ , 有

$$(a_1, \dots, a_n) \in P^{\mathfrak{A}} \Leftrightarrow (h(a_1), \dots, h(a_n)) \in P^{\mathfrak{B}}$$

- 对每个  $n$  元 函数符号  $f$ , 和每组  $a_1, \dots, a_n \in |\mathfrak{A}|$ , 有

# 同态与同构

## 例

考虑有理数有序域  $\mathbb{Q} = (\mathbb{Q}, 0^{\mathbb{Q}}, +^{\mathbb{Q}}, \cdot^{\mathbb{Q}}, <^{\mathbb{Q}})$ 。定义函数

$h : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Z} \times (\mathbb{N} \setminus \{0\})$ : 对任意  $q \in \mathbb{Q}$ , 令

$n_q = \min \{n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \mid q \cdot n \in \mathbb{Z}\}$ , 而  $i_q = q \cdot n_q$ ,  $h(q) = (i_q, n_q)$ 。

定义  $\mathbb{Z} \times (\mathbb{N} \setminus \{0\})$  上函数  $+^*$  和  $\cdot^*$ :

- ( $i, n$ )  $+^*$  ( $j, m$ ) =  $(im +^{\mathbb{Z}} jn, nm)$

- ( $i, n$ )  $\cdot^*$  ( $j, m$ ) =  $(ij, nm)$

定义  $(i, n) <^* (j, m)$ , 当且仅当  $im <^{\mathbb{Z}} jn$ 。则  $h$  是从  $\mathbb{Q}$  到  $(\mathbb{Z} \times (\mathbb{N} \setminus \{0\}), (0, 1), +^*, \cdot^*, <^*)$  的同态

## 同态与同构

直观上，同态保持两个结构对谓词符号、函数符号和常数符号的解释。

那么，什么时候算是也保持对等词和量词的解释呢？

# 同态与同构

## 定义 (嵌入与同构)

令  $h : |\mathfrak{A}| \rightarrow |\mathfrak{B}|$  是从  $\mathfrak{A}$  到  $\mathfrak{B}$  的同态

- 如果同态  $h$  是 **单射** 的，我们称  $h$  是一个从  $\mathfrak{A}$  到  $\mathfrak{B}$  的 **嵌入** (embedding)；
- 如果  $h$  是双射 (既是单射，又是满射)，我们称  $h$  是一个从  $\mathfrak{A}$  到  $\mathfrak{B}$  的 **同构** (isomorphism)。此时，我们称  $\mathfrak{A}$  与  $\mathfrak{B}$  同构，记  $\mathfrak{A} \cong \mathfrak{B}$

# 同态与同构

## 定理 (同态定理)

给定语言  $\mathcal{L}$ 。假定  $h$  是从  $\mathcal{L}$  结构  $\mathfrak{A}$  到  $\mathfrak{B}$  的同态， $s$  是  $\mathfrak{A}$  赋值。则

- 1 对任意项  $t$ ,  $h(\bar{s}(t)) = \overline{h \circ s}(t)$  (习题)
- 2 对任何不含量词且不含等词的公式  $\alpha$ ,

$$(\mathfrak{A}, s) \models \alpha \Leftrightarrow (\mathfrak{B}, h \circ s) \models \alpha$$

- 3 若  $h$  是单射，则  $\alpha$  可含等词；若  $h$  是双射，可含量词

# 同态与同构

## 定义

如果  $h : |\mathfrak{A}| \rightarrow |\mathfrak{A}|$  是从  $\mathfrak{A}$  到  $\mathfrak{A}$  的一个同构，那么我们称  $h$  是  $\mathfrak{A}$  上的 **自同构** (automorphism)

## 推论

令  $h$  是  $\mathfrak{A}$  上的一个自同构，并且  $R \subset |\mathfrak{A}|^n$  是一个  $\mathfrak{A}$  中 **可定义的**  $n$  元关系，则对任意  $|\mathfrak{A}|$  中元素  $a_1, \dots, a_n$  有，

$$(a_1, \dots, a_n) \in R \Leftrightarrow (h(a_1), \dots, h(a_n)) \in R$$

# 同态与同构

上述定理为我们提示了一种证明“不可定义”的方法。

## 例

还是考虑结构

$$b \leftarrow a \rightarrow c$$

证明  $\{b\}$  是不可定义的

## 下期预告

- 初等等价
- 一阶逻辑的可靠性定理

# 习题

- 5.1.2 - 5.1.6
- 5.2.2 - 5.2.4
- 5.3.1 (如果课上没讲) , 5.3.2, 5.3.4, 5.3.5